Практическое занятие #2. Билинейные формы

Курс: двухсеместровый. Семестр: весна.

Ключевые слова:

- билинейная форма;
- равные билинейные формы, нулевая билинейная форма;
- сумма билинейных форм;
- произведение билинейной формы на число;
- пространство билинейных форм;
- симметричная билинейная форма;
- антисимметричная билинейная форма;
- коэффициенты билинейной формы, матрица билинейной формы;
- преобразование матрицы билинейной формы при преобразовании базиса;
- квадратичная форма, матрица квадратичной формы.

Задание 1: примеры билинейных форм

Какие из следующих функций двух аргументов являются билинейными формами в соответствующих пространствах? Какие из билинейных форм являются симметричными, антисимметричными? В конечномерных пространствах выберите базис и найдите матрицы соответствующих билинейных форм:

- $b(x,y)=x^T\cdot y$, где $x,y\in\mathbb{Q}^n$ (n-мерное арифметическое пространство над полем \mathbb{Q}).
- $b(A,B) = \operatorname{tr}(A \cdot B)$, где $A,B \in M_2(\mathbb{R})$.
- $b(A,B) = \operatorname{tr}(A \cdot B B \cdot A)$, где $A,B \in M_2(\mathbb{R})$.
- $b(A, B) = \det(A \cdot B)$, где $A, B \in M_2(\mathbb{R})$.
- $b(u,v)=\mathrm{Re}(uv)$, где $u,v\in\mathbb{C}(\mathbb{R})$ (\mathbb{C} рассматривается как линейное пространство над полем \mathbb{R}).
- b(u,v)=|uv|, где $u,v\in {\mathbb C}({\mathbb R})$ (${\mathbb C}$ рассматривается как линейное пространство над полем \mathbb{R}).
- b(x, y) = сумма координат вектора, полученного в результате векторногопроизведения $[x \times y]$ в заданном базисе.
- $b(f,g)=\int_a^b (f(t)+g(t))dt$, где $f,g\in C_{[a,b]}$. $b(p,q)=\frac{d}{dt}(pq)(a)$, где $p,q\in\mathbb{R}^{\,<\,}[x],a\in\mathbb{R}$.

Задание 2: разложение билинейной формы

Представьте билинейную форму в виде суммы симметричной и антисимметричной билинейных форм.

$$b(x, y) = x^{1}y^{1} + 3x^{2}y^{2} + x^{2}y^{3} + 2x^{3}y^{1} - 3x^{3}y^{2}$$

Найдите матрицы симметричной и антисимметричной компонент билинейной формы.

P.S. также как и ранее, верхние индексы означают не степень, а индексацию компонент вектора.

Задание 3: представление в виде произведения линейных форм

Пусть даны две линейные формы

$$f(x) = 2x^{1} + x^{2} - x^{3}$$
$$g(x) = -x^{1} - x^{2} + 2x^{3}$$

Запишите билинейную форму $b(x,y)=f(x)\cdot g(y)$, а также $c(x,y)=g(x)\cdot f(y)$.

- Найдите матрицы B и C этих билинейных форм.
- Установите зависимость их со строками коэффициентов линейных форм f и g.
- Как связаны матрицы B и C при таком построении билинейных форм?

Задание 4: преобразование матрицы билинейной формы

Найдите матрицу B билинейной формы b(x,y) в новом базисе, если задана её матрица и координаты векторов нового базиса в старом базисе.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} e'_1 = e_1 - e_2 \\ e'_2 = e_1 + e_3 \\ e'_3 = e_1 + e_2 + e_3 \end{cases}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} e'_1 = e_1 - e_2 \\ e'_2 = e_1 + e_2 - e_3 \\ e'_2 = e_2 - e_3 \\ e'_3 = -e_1 + e_2 - 3e_3 \end{cases}$$

Задание 5: значение билинейной формы

Рассмотрите векторы $x = (2, 1, 3)^T$ и $y = (1, -1, -1)^T$.

• Найдите значение билинейной формы, заданной любой из матриц в предыдущем задании, используя

$$b(x, y) = x^T B y$$

• Преобразуйте координатные столбцы векторов x и y в новый базис;

• Найдите значение билинейной формы при помощи матрицы, полученной в новом базисе на векторах, которые также представлены в нем

$$b(x, y) = x'^T B' y'$$

• Сравните полученные значения

Задание 6: квадратичные формы

Запишите квадратичную форму, соответствующую данной билинейной форме. Составьте матрицу квадратичной формы.

•
$$b(x,y) = 2x^1y^1 - x^1y^2 - x^2y^1 - 5x^2y^2$$
, где $x,y \in \mathbb{R}^2$

•
$$b(x,y) = 2x^1y^1 - x^1y^2 + x^2y^1 - 5x^2y^2$$
, где $x,y \in \mathbb{R}^2$

•
$$b(x,y) = 2x^1y^1 - x^1y^2 - x^2y^1 - 5x^2y^2$$
, где $x,y \in \mathbb{R}^3$

•
$$b(x,y)=x^1y^1+2x^1y^2+2x^1y^3-2x^2y^1+3x^2y^2+x^2y^3+x^3y^1-5x^3y^2-3x^3y^3$$
, где $x,y\in\mathbb{R}^3$

В первых двух случаях найдите полярную билинейную форму, используя

$$b(x, y) = \frac{1}{2}(q(x + y) - q(x) - q(y))$$

В третьем случае восстановите полярную билинейную форму, используя ее связь с матрицей квадратичной формы.